

## O IMPACTO DA ENFERMAGEM NO CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES NO LEITE HUMANO

Edna Maria Ferreira Lima<sup>1</sup>

Marielle Ribeiro Feitosa<sup>2</sup>

Rosy Denyse Pinheiro de Oliveira<sup>2</sup>

Antônia Alessandra Alves Batista<sup>1</sup>

Bárbara Osório Xavier Montezuma<sup>3</sup>

Kalyni Silvino Serra<sup>4</sup>

**Introdução:** A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano é uma ação estratégica da Política Nacional de Aleitamento Materno responsável em promover, proteger e apoiar a prática de aleitamento materno para a redução da mortalidade infantil no mundo. Um dos seus objetivos é desenvolver metodologias de controle de qualidade do leite ordenhado como a identificação dos tipos de não conformidades.<sup>1</sup> **Objetivo:** Relatar a experiência das intervenções para a redução das sujidades no leite humano ordenhado. **Método:** Esse estudo é do tipo relato de experiência sobre as orientações das enfermeiras Banco de Leite Humano (BLH) as doadoras de leite humano como intervenção de redução das sujidades no leite humano ordenhado de uma maternidade referência em saúde da mulher e da criança ligada a EBSEH em Fortaleza-Ce em 2023. **Resultados:** A avaliação da presença de sujidades deve ser realizada por profissional capacitado do BLH, com o objetivo de determinar prováveis alterações (corpo estranho) que caracterizem sujidades. São considerados sujidades comumente encontradas no leite humano: pelos humanos e de tecido, cabelos, fragmentos de pele, fragmentos de unha, insetos, pedaços de papel, vidro, entre outros. Após essa identificação as doadoras do leite humano são contactadas de modo individual pelas enfermeiras do BLH, seja por telefone e /ou rede social (WhatsApp) para que possam ser informadas sobre o descarte do seu leite e principalmente como coletar e armazenar de modo seguro com o máximo de aproveitamento. Essas orientações são realizadas diariamente de forma educativa e cordial. **Conclusão:** As orientações como intervenção na redução das sujidades no leite humano são necessárias, pois contribuem para a diminuição da perda de leite humano e para um maior aproveitamento e distribuição aos que mais precisam, os recém-nascidos internados nas unidades neonatais.

### REFERÊNCIAS:

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2008
2. Marchiori GRS, Alves VH, Pereira AV, Vieira BDG, Rodrigues DP, Dulfe PAM, Santos MV. Nursing actions in human milk banks in times of COVID-19. Rev Bras Enferm. 2020; 73(Suppl 2):e2020 0381. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0381>

<sup>1</sup> Técnica de enfermagem na MEAC/UFC-EBSEH

<sup>2</sup> Enfermeira na MEAC/UFC-EBSEH

<sup>3</sup> Farmacêutica na MEAC/UFC-EBSEH

<sup>4</sup> Enfermeira residente em obstetrícia na MEAC/UFC-EBSEH